Referentiewaarden trombocytenparameters

Vrouwen						
	0 - 6 mnd	6 - 24 mnd	1 - 6 jaar	6 - 12 jaar	12 - 18 jaar	>18 jaar
MPV (fL)	9,0 - 10,9	8,8 - 10,6	8,9 - 11	9,3 - 11,3	9,6 - 11,7	9,6 - 12
IPF (%)	1,3 - 6,8	1,4 - 4,5	1,0 - 3,6	1,0 - 4,7	1,4 - 6,4	1,0 - 9,2

Mannen						
	0 - 6 mnd	6 - 24 mnd	1 - 6 jaar	6 - 12 jaar	12 - 18 jaar	>18 jaar
MPV (fL)	8,9 - 10,6	8,7 - 10,5	9,0 - 10,9	9,2 - 11,4	9,6 - 11,8	9,7 - 11,9
IPF (%)	2,0 - 6,8	1,4 - 3,8	1,1 - 3,6	1,0 - 4,9	1,6 - 6,1	1,0 - 9,2

Referentiewaarden voor PDW en PCRT zijn niet beschikbaar

Bron referentiewaarden kinderen: Pediatric reference intervals 7th edition; AACC press; 2011.
Referentiewaarden moeten beschouwd worden als een globale leidraad voor het interpreteren van uitslagen. Bovenstaande referentiewaarden voor kinderen zijn gebaseerd op data uit Amerikaans onderzoek bij poliklinische patienten, waarbij hematologie/oncologie patienten uitgesloten zijn. Door middel van statistische analyses is een selectie gemaakt van uitslagen die bruikbaar worden geacht voor het vaststellen van referentiewaarden. Deze aanpak is gekozen vanwege de praktische problemen en bezwaren bij het verkrijgen van monsters van gezonde kinderen. De waarden zijn verkregen met dezelfde methode als de methode die in het UMCG wordt gebruikt (Sysmex XE2100).

Bron referentiewaarden volwassenen (>18 jaar):

MPV: Pediatric reference intervals 7th edition; AACC press; 2011. Zie tekst bij Bron referentiewaarden kinderen

IPF: Beperkt eigen referentiewaardenonderzoek 2014 (niet gestratificeerd naar leeftijd en geslacht en zonder informatie over gezondheidstoestand)

NB: Oude referentiewaarden gebruikt tot 6 april 2016 zijn op te vragen bij het laboratorium